

OCUhyl C

hyaluronát sodný 1,2 mg/ml

Forma: Očná roztoková instilácia

Výrobca ZP:

UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Bratislava, Slovenská republika

Zloženie:

Natrii hyaluronas (Hyaluronát sodný) 1,2 mg/ml

Pomocné látky: calendulae extractum (extrakt nechtíka lekárskeho), natrii chloridum (chlorid sodný), dinatrii phosphas anhydricus (hydrogenfosforečnan disodný bezvodý), kalii chloridum (chlorid draselný), calcii chloridum dihydricum (chlorid vápenatý), magnesii chloridum hexahydricus (chlorid horečnatý), aqua ad iniectionem (voda na injekciu).

Charakteristika:

OCUhyl C sú sterilné očné kvapky so zvlhčujúcim, upokojujúcim a lubrikačným účinkom, určené zvlášť pre citlivé oči. Vďaka obsahu kyseliny hyalurónovej (prirodzene sa vyskytujúca látka v oku i v iných častiach tela) poskytujú tieto kvapky efektívnu úľavu a dlhotrvajúci komfort pri pociťovaní suchosti, pálenia alebo únavy očí. Očné kvapky **OCUhyl C** sú navyše obohatené prídavkom prírodného extraktu nechtíka lekárskeho, ktorý má ochranný, protizápalový a regeneračný účinok na epitel oka. **OCUhyl C** neobsahuje žiadne konzervačné ani antimikrobiálne prísady, a preto sú tieto kvapky určené i pre ľudí s citlivými očami, ako i pre nositeľov kontaktných šošoviek. **OCUhyl C** môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Použitie:

OCUhyl C je určený na vonkajšie použitie do oka. Používa sa ako podporná liečba pri zníženej tvorbe slz, u stavov spojených s pocitom sucha, pocitom cudzieho telieska v oku, únavou alebo pálením. Používa sa tiež k posilneniu ochranného slzného filmu na rohovke a spojovke oka. **OCUhyl C** sa môže používať počas nosenia kontaktných šošoviek.

OCUhyl C nepoužívať:

OCUhyl C sa nesmie používať pri precitlivencosti na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku prípravku.

Nežiaduce účinky:

Zriedkavo sa bezprostredne po aplikácii môže vyskytnúť prechodné mierne pálenie. Tiež sa môže vyskytnúť alergická reakcia.

Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií hláste svojmu lekárovi.

Interakcie:

V prípade súčasného používania iných očných kvapiek je potrebné aplikovať **OCUhyl C** ako posledný a to minimálne 5 minút po aplikácii predchádzajúcich očných kvapiek. Váš lekár by mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, prípadne ktoré ste donedávna užívali alebo začnete užívať, a to na lekárske predpis i bez neho. Ak užívate aj iné očné prípravky, poraďte sa o vhodnosti ich súčasného používania s očným lekárom.

Dávkovanie a spôsob podávania:

Ak lekár neurčí inak, aplikuje sa zvyčajne do spojovkového vaku 1 kvapka 1 až 3 krát denne, môže sa však používať aj častejšie. U detí určí dávkovanie individuálne lekár. Prípravok môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Upozornenie:

Tesne po aplikácii prípravku sa môže objaviť neostré videnie, nedoporučuje sa preto asi 20 minút po aplikácii prípravku riadiť motorové vozidlo, obsluhovať stroje alebo pracovať vo výške.

Pri náhodnom užití prípravku dieťaťom kontaktujte lekára.

Spôsob na zaobchádzanie so ZP:



1. Plastovú fľaštičku s OSD uzáverom vyberte z papierového balenia.



2. Pred prvým použitím odstráňte poistný bezpečnostný prúžok OSD uzáveru.



3. Zložte ochranný vrchnák OSD uzáveru.



4. Zakloňte hlavu dozadu, otočte plastovú fľaštičku hore dnom, ukazovákom jemne potiahnite spodné očné viečko, kvapnite predpísaný počet kvapiek a pomaly zatvorte oko, aby sa **OCUhyl C** rovnomerne rozmiestnil po očnom povrchu.

Pri aplikácii sa nemá dotknúť špička kvapkadla oka ani mihalníc. Nakoniec je nutné po nakvapkaní prípravku do oka pevne nasadiť ochranný uzáver späť na vrch fľaštičky, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii špičky kvapkadla.

Upozornenie pri aplikácii:

Po každom stlačení plastovej fľaštičky vyjde len jedna kvapka **OCUhyl C**. Pre ďalšiu kvapku treba nechať späťne nasať vzduch do plastovej fľaštičky, aby sa plastová fľaštička vrátila do pôvodného stavu.

Prípravok sa nesmie použiť po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale. Otvorené balenie spotrebujte do 3 mesiacov.

Balenie: 1 × 10 ml

Uchovávanie:

Uchovávať pri teplote do 25 °C.

Chrániť pred chladom a mrazom.

Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie textu: August 2011



2265